

Prueba final de Análisis Probabilístico de Algoritmos

Respuestas

- (1 pt) Respecto a la complejidad de los algoritmos basados en fusiones, la entropía de rachas \mathcal{H} permite obtener
A. una cota mínima B. una cota máxima C. una aproximación D. la media.
- (1,5 pts) Los tiempos de búsqueda de Linear Probing se degradan más rápidamente que los de Random Probing cuando la tasa de ocupación α es grande. Dar una interpretación intuitiva.

Respuesta. Recordamos que Linear Probing corresponde a la secuencia de búsqueda siguiente: si la celda está ocupada, ir a la siguiente. El problema de Linear Probing, cuando α es grande, es que tienden a formarse segmentos ocupados. Este no es el caso en Random Probing, que salta a posiciones aleatorias.

- (2 pts) Explicar por qué puede ser útil sesgar los if's de un algoritmo para que sean **True** (o **False**) con probabilidad mayor que $1/2$.

Respuesta. El pipeline del procesador permite acelerar la ejecución, ejecutando partes de varias instrucciones en paralelo. La presencia de un **if** requiere la predicción de qué "rama" será ejecutada después. Si un **if** es **True** (o **False**) con probabilidad $1/2$, este resulta imposible de predecir. En cambio, si este fuera predecible, esto puede resultar (quizás) en una aceleración de los tiempos ejecución.

- (2,5 pts) Consideremos una clase combinatoria \mathcal{A} que representa funciones como árboles binarios con las siguientes características:
 - hojas decoradas con los números **0**, **1** o un símbolo de variable x .
 - nodos internos decoradas con los operadores $+$ o \times ,
 - el tamaño (o talla) igual al número de nodos internos (las hojas tienen talla 0).

Dar una especificación combinatoria para \mathcal{A} . Encontrar la función generatriz $A(z)$.

[La especificación puede ser recursiva, y utilizar el elemento vacío \mathcal{E} y/o el átomo \mathcal{Z} .]

Respuesta. La especificación es:

$$\mathcal{A} = \mathbf{0} + \mathbf{1} + x + \{+\} \times \mathcal{A} \times \mathcal{A} + \{\times\} \times \mathcal{A} \times \mathcal{A}.$$

Usando los átomos de talla uno \mathcal{Z} , y de talla cero \mathcal{E} , podemos también escribir:

$$\mathcal{A} = \mathcal{E} + \mathcal{E} + \mathcal{E} + \mathcal{Z} \times \mathcal{A} \times \mathcal{A} + \mathcal{Z} \times \mathcal{A} \times \mathcal{A}.$$

Esto se traduce en:

$$A(z) = 3z^0 + 2z(A(z))^2 .$$

Resolviendo, y notando la solución que tiene sentido en $z = 0$, obtenemos

$$A(z) = \frac{1 - \sqrt{1 - 24z}}{4z} .$$

5. (3 pts) Aplicando fracciones simples obtenemos

$$f(z) = \frac{z + 3}{(1 - z) \cdot (1 - 2z)^2} = -\frac{8}{1 - 2z} + \frac{7}{(1 - 2z)^2} + \frac{4}{1 - z} .$$

Encontrar una fórmula para $a_n = [z^n]f(z)$. Dar un asintótico simple para a_n .

Respuesta. Tenemos

$$[z^n]f(z) = -8 \cdot 2^n + 7 \cdot (n + 1) \cdot 2^n + 4 .$$

usando

$$[z^n] \frac{1}{1 - 2z} = 2^n, \quad [z^n] \frac{1}{(1 - 2z)^2} = (n + 1) 2^n, \quad [z^n] \frac{1}{1 - z} = 1 .$$

El término dominante es $7 \cdot (n + 1) \cdot 2^n$, así $[z^n]f(z) \sim 7n 2^n$.